

TALENDO®

Fungicida antioidico per la Vite da vino e la Vite da tavola.
CONCENTRATO EMULSIONABILE.
Meccanismo d'azione: Gruppo 13 (FRAC)

Composizione di TALENDO

Proquinazid puro g 20,53 (200 g/L)

Coformulanti q.b. a g 100

Contiene: Calcio dodecilbenzenesulfonato



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H315: Provoca irritazione cutanea. **H318:** Provoca gravi lesioni oculari.
H351: Sospettato di provocare il cancro. **H410:** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401:** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. **P280:** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P305+P351+P338:** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P308+P313:** IN CASO DI esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. **P391:** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501:** Smaltire il contenuto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Corteva Agriscienze Italia s.r.l – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona Tel. +39 0372 709900

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o confezionamento:

Corteva Agriscienze France S.A.S. – Cernay – Francia

Phyteurop – Montreuil-Bellay – Francia

Sinteco Logistics SpA – San Giuliano Milanese (MI) – Italia

(solo ri-etichettatura)

Taglie autorizzate: 0,25 – 0,5 – 1 – 2,5 Litri

Registrazione N° 12106 del 16.03.2007 del Ministero della Salute

Partita N. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

-Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

-Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 16 metri dai corpi idrici superficiali.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il recipiente ben chiuso – E'obbligatorio per l'operatore l'uso di dispositivi per la protezione degli occhi - Non riutilizzare gli imballi che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO:

- Inalazione:** se inalato, portare immediatamente il paziente all'aria fresca. Se il paziente non respira, praticare la respirazione artificiale. Se la respirazione è difficoltosa, somministrare ossigeno. Consultare un medico.
- Contatto con la pelle:** in caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone. Gli indumenti contaminati dovranno essere lavati prima del loro riutilizzo.
- Contatto con gli occhi:** in caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico.
- Ingestione:** se il prodotto viene ingerito, non indurre il vomito. Somministrare uno o due bicchieri di acqua; non somministrare mai niente per via orale ad un paziente in stato di incoscienza. Consultare immediatamente un medico.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche di azione

TALENDO è un fungicida organico formulato in concentrato emulsionabile efficace contro l'Oidio della vite (*Uncinula necator*). TALENDO è dotato di attività preventiva ed agisce per contatto. TALENDO contiene proquinazid, principio attivo che agisce sulla germinazione delle spore inibendo la formazione degli appressori secondari; proquinazid appartiene alla famiglia chimica dei quinazolinoni.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO

VITE (da vino e da tavola):

TALENDO s'impiega alla dose di 20–25 ml di prodotto ogni 100 litri d'acqua (avendo cura di applicare comunque 200 ml/ha di prodotto con volumi d'acqua inferiori a 10 hl per ettaro).

A seconda delle attrezzature impiegate si possono utilizzare da 3 a 15 hl/ha, avendo cura di bagnare bene la vegetazione e i grappoli.

Applicare TALENDO ogni 10-14 giorni adottando l'intervallo più breve se le condizioni meteorologiche e agronomiche comportano rischi di gravi infezioni.

TALENDO può essere applicato a partire dallo stadio di tre foglie e fino alla invaiatura, rispettando l'intervallo di sicurezza di 28 giorni, per un massimo di 3 trattamenti per ciclo colturale. Date le caratteristiche preventive del prodotto, si raccomanda di iniziare le applicazioni di TALENDO prima della comparsa dei sintomi di oidio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA:

Dopo aver riempito per circa un terzo della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di TALENDO direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:

- TALENDO deve essere applicato preventivamente.
- Il numero massimo di applicazioni di TALENDO è di 3 per ciclo colturale, di cui non più di due consecutive.
- Dove l'Oidio sia già presente, TALENDO deve essere impiegato in miscela od in successione ad un prodotto antioidico attivo sul micelio.
- In un corretto programma di difesa antioidica, i trattamenti con TALENDO devono essere alternati con applicazioni di antioidici a diverso meccanismo d'azione, utilizzati secondo le indicazioni delle rispettive etichette autorizzate.

COMPATIBILITA'

TALENDO è fisicamente compatibile con gli altri prodotti fitosanitari utilizzati su vite. Non sono attualmente noti casi di incompatibilità.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di:

- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**

Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-333 2107947 (24H)

Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**: contattare: 0039 0372 709900 (O.U.)

Etichetta autorizzata con D.D. del 05/09/2022 con validità dal 01/10/2022