



**Fontelis<sup>®</sup>**

FUNGICIDA


**Vertiaro<sup>®</sup>**

FUNGICIDA

---

**AFFIDABILITÀ AL SERVIZIO  
DELLA PROTEZIONE  
DELLE DRUPACEE.**


## Scheda tecnica di Fontelis®

<b>Prodotto</b>	Fontelis®
<b>Composizione</b>	Penthiopyrad 200 g/L
<b>Registrazione</b>	n° 15005 del 11.07.2013 del Ministero della Salute
<b>Formulazione</b>	Sospensione Concentrata (SC)
<b>Patogeni controllati</b>	Monilia ( <i>Monilia laxa</i> , <i>Monilia fructigena</i> , <i>Monilia fructicola</i> ) e oidio ( <i>Podosphaera tridactyla</i> e <i>Sphaerotheca pannosa</i> )
<b>Classificazione CLP</b>	 ATTENZIONE
<b>Gruppo FRAC</b>	7

Coltura	Patologia	Dose ad ettaro	N. max di tratt./anno	Int. sic. gg.
Pesco, nettarine, albicocco	Monilia ( <i>Monilia laxa</i> , <i>Monilia fructigena</i> e <i>Monilia fructicola</i> ) e Oidio ( <i>Podosphaera tridactyla</i> e <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	Durante la fase di fioritura: 1,2 L/ha disciolto in 500-1000 litri di acqua	1	3
		Durante la fase di sviluppo e maturazione dei frutti: 1,5 L/ha disciolto in 500-1000 litri di acqua	2	

## I principali vantaggi di Fontelis®

- Ampio spettro d'azione su: Monilia (*Monilia laxa*, *Monilia fructigena* e *Monilia fructicola*) e Oidio (*Podosphaera tridactyla* e *Sphaerotheca pannosa*).
- Elevata resistenza al dilavamento.
- Ottima selettività su pronubi ed insetti utili.
- Unisce un'ottima mobilità all'interno della pianta ad un'elevata resistenza al dilavamento (già dopo 15 minuti dal trattamento).
- Elevata efficacia su fiori e frutti; durante la fase di sperimentazione, si è dimostrato molto efficace nel controllo dell'oidio e delle moniliosi delle drupacee rispetto ai prodotti di riferimento.
- Compatibile con moltissimi agrofarmaci in commercio.



## Scheda tecnica di Vertiaro®

<b>Prodotto</b>	Vertiaro®
<b>Composizione</b>	Difenoconazolo 250 g/L
<b>Registrazione</b>	n° 15292 del 29.12.2011 del Ministero della Salute
<b>Formulazione</b>	Emulsione oncentrata (EC)
<b>Patogeni controllati</b>	Bolla ( <i>Taphrina deformans</i> ) e Monilia ( <i>Monilia fructicola</i> )
<b>Classificazione CLP</b>	 PERICOLO
<b>Gruppo FRAC</b>	G1

Titolare registrazione Syngenta Italia S.p.A.


Coltura	Patologia	Dose ad ettaro	N. max di tratt./anno	Int. sic. gg.
Pesco	Bolla ( <i>Taphrina deformans</i> ), Monilia ( <i>Monilia fructicola</i> )	0,3- 0,45 L/ha	2	7

## I principali vantaggi di Vertiaro®

- Ampio spettro d'azione
- Mobile nella pianta e affine alle cere (max protezione)
- Ottima resistenza al dilavamento
- Preventivo e curativo all'inizio della infezione
- Eccellente profilo ecotossicologico
- Elevata qualità formulativa
- Pratico packaging da 0,5 L

## Posizionamento tecnico drupacee

### Strategie per la difesa dalle patologie del pesco



#### Prima strategia

2 trattamenti con: **Fontelis® e Vertiaro®** (intervallo 7 gg)

2 trattamenti con: **Vertiaro®** (intervallo 7 gg)

#### Seconda strategia

2 trattamenti con: **Vertiaro®** (intervallo 7 gg)

2 trattamenti con: **Fontelis® e Vertiaro®** (intervallo 7 gg)

\*Vertiaro® attivo anche su bolla

Visita il sito [corteva.it](http://corteva.it)