

RELDAN™ 22

CIMICE ASIATICA

Insetticida ad ampio spettro d'azione che agisce per contatto, ingestione ed asfissia, per il controllo della cimice asiatica del pesco, nettarine

CONCENTRATO EMULSIONABILE

GRUPPO IRAC:B1

Composizione di RELDAN 22 CIMICE ASIATICA

Clorpirifos-metile puro g 21,4 (= 225 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

Contiene: Idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% di naftalene
Idrocarburi, C10, aromatici, <1% di naftalene



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: **H304** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **H315** Provoca irritazione cutanea. **H317** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H336** Può provocare sonnolenza o vertigini. **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: **P261** Evitare di respirare i vapori. **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P301 + P310** In caso di ingestione: contattare immediatamente un Centro Antiveleeni o un medico. **P302 + P352** In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P331** Non provocare il vomito. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia Srl - Mozzanica (Bergamo)
Dow AgroSciences Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (Inghilterra)
Sinteco Logistics SpA - S.Giuliano Milanese (MI) (solo ri-etichettatura)

Taglie autorizzate: 1-5 litri

Registrazione n.17588 del 17 aprile 2020 del Ministero della Sanità
Partita n.: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante miscelazione, caricamento, applicazione del prodotto utilizzare guanti, tuta da lavoro e dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (FP2, P2 e simili). Effettuare le applicazioni con trattore cabinato. Non applicare con equipaggiamento manuale. Per il rientro in campo indossare tuta protettiva che copra corpo, braccia e gambe. Effettuare i trattamenti in modo da evitare che la deriva dell'applicazione raggiunga edifici pubblici e privati. In prossimità di tali aree utilizzare dispositivi che riducano la deriva del 95% e mantenere una fascia di rispetto non trattata di 20 metri. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le api: non applicare durante la fioritura; non utilizzare quando le api sono in attività; rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione; eliminare le piante infestanti prima della fioritura; per le applicazioni in frutteto, assicurarsi che qualsiasi copertura in fiore sia falciata o pacciamata prima dell'applicazione.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia non trattata, dai corpi idrici superficiali, di 25 metri, di cui 20 metri di fascia vegetata, in combinazione con misure che riducano la deriva del 95%. Intervenire, con un solo trattamento, dopo la "scamiciatura" nella fase di accrescimento dei frutti per uso su drupacee.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia non trattata da zone non coltivate di:

- 15 m oppure 5 m in combinazione con una riduzione della deriva del 75% per drupacee

Durante miscelazione, caricamento, applicazione del prodotto e rientro in campo indossare tuta e guanti protettivi. Rientrare in campo solo quando la vegetazione risulta completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Se ingerito non indurre il vomito. **Consultare un Centro Antiveleeni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

RELDAN 22 CIMICE ASIATICA è un insetticida fosfororganico, agisce per contatto, ingestione ed in parte per azione di vapore.

DRUPACEE (Pesco, Nettareina)

Contro la Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) eseguire 1-2 trattamenti alla presenza del parassita con dosi di 200 ml/ha e un dosaggio massimo di 3L/ha. Rispettare un intervallo minimo fra i trattamenti di 14 giorni. Dosi calcolate su un volume d'acqua di 1000 l/ha.

COMPATIBILITÀ: RELDAN 22 CIMICE ASIATICA non è miscibile con i fitofarmaci a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Informazioni relative ai fenomeni di resistenza: Ai fini di una corretta gestione della resistenza, si consiglia sempre di inserire il prodotto in un calendario che preveda l'alternanza di prodotti a base di clorpirifos-metile con altri prodotti contenenti una sostanza attiva diversa.

Intervallo di sicurezza: 15 giorni prima della raccolta per drupacee.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**

Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)

Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17/04/2020

Con validità dal 17/04/2020 al 15/08/2020.