# ARIANE<sup>TM</sup> II

Erbicida selettivo per frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e triticale, efficace contro infestanti a foglia larga.

## EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)

#### Composizione di ARIANE II

FLUROXIPIR meptil-eptil estere puro 5,3 g (57,6 g/l, pari a 40 g/l di acido equivalente)

CLOPIRALID sale di monoetanolammonio puro 2,4 g (26,4 g/l, pari a 20 g/l di acido equivalente)

MCPA sale potassico puro 21,9 g (238,1 g/l, pari a 200 g/l di acido equivalente) Coformulanti q.b. a g 100



**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501: Smaltire il contenuto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Corteva Agriscience Italia s.r.l – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona Tel. +39 0372 709900

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento: Corteva Agriscience France S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)

DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)

TORRE Srl - Torrenieri (Fraz. Montalcino) - SI

Arco Logistica S.r.l - Ferrara (FE) – Italia (solo ri-etichettatura)

Sinteco Logistics SpA – S.Giuliano Milanese (MI) (solo ri-etichettatura)

Taglie autorizzate: 1 - 5 - 10 litri

Registrazione n. 8376 del 07/08/1993 del Ministero della Sanità

Partita n. Vedere sulla confezione

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata. In caso di interruzione della coltivazione con perdita del raccolto, si raccomanda di attendere almeno 125 giorni dal trattamento prima di effettuare la semina di una nuova coltura. E' tuttavia possibile seminare mais, sorgo e graminacee dopo un mese dall'applicazione avendo cura di effettuare una lavorazione superficiale, senza utilizzare ulteriormente prodotti a base di clopiralid.

#### INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FLUROXIPIR puro 3,7%; CLOPIRALID puro 1,8%; MCPA puro 18,4%; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

<u>Fluroxipir:</u> negli animali da esperimento irritante per la cute, occhi e mucose; organo bersaglio: fegato e rene. <u>Clopiralid:</u> -----

MCPA: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. Consultare un Centro Antiveleni.

## USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

ARIANE II è un erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza di frumento tenero e duro, orzo, segale, avena e triticale.

ARIANE II è attivo contro le principali infestanti a foglia larga, comprese quelle meno sensibili o resistenti agli erbicidi fenossiderivati.

ARIANE II è particolarmente attivo contro:

attaccamano (Galium aparine), borsa pastore (Capsella bursa-pastoris), camomilla bastarda (Anthemis arvensis), camomilla comune (Matricaria chamomilla), canapetta (Galeopsis tetrahit), cardo mariano (Silybum marianum), centocchio comune (Stellaria media), centocchio dei campi (Anagallis arvensis), crisantemo (Chrysanthemum segetum), erba morella (Solanum nigrum), erba storna (Thlaspi arvense), falsa ortica. (Lamium spp.), fiordaliso (Centaurea cyanus), fumaria (Fumaria officinalis), non ti scordar di me (Myosotis arvensis), papavero (Papaver spp.), poligono convolvolo (Polygonum convolvulus), ravanello selvatico (Raphanum raphanistrum), romice (Rumex spp.), senape (Sinapis arvensis), stoppione (Cirsium arvense), veccia (Vicia spp.), veronica (Veronica spp.), vilucchio (Convolvulus arvensis).

#### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

ARIANE II si applica alla dose di 3,5 - 4 litri per ettaro, dall'accestimento al secondo nodo della coltura. La dose più alta va usata in presenza di basse temperature (meno di 10°C medi giornalieri) e di infestanti «difficili», quali borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), papavero (*Papaver spp.*), veronica (*Veronica spp.*). Il prodotto deve essere utilizzato alla dose stabilita con volumi di acqua di 200-400 litri ad ettaro. E' consentito 1 solo trattamento.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi, floreali in genere, ecc. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di deriva portata dal vento.

ARIANE II non consente la trasemina delle leguminose.

Non seminare soia su terreno sodo dopo il cereale trattato con ARIANE II.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 70 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. No applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti, contattare: 0039 0372 709900/70999 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 e modificata ai sensi dell'art.7 comma 1, D.P.R. n. 55/2012 con validità dal 01/10/2024