

BREK DUO

Fungicida endoterapico per la difesa di frumento e orzo
Formulazione liquida (EW)
Meccanismo azione codice FRAC: 03

BREK DUO - Composizione:

- Tetraconazolo puro g. 3,9 (41 g/l)
 - Procloraz puro g. 21,9 (230 g/l)
 - Coformulanti: quanto basta a g. 100
- Contiene triazina sostituita: può provocare una reazione allergica

ISAGRO S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901209 (emergenze)

Registrazione Ministero della Salute n° 14021 del 17.10.2007

Officina di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (Rovigo); Sipcam S.p.A. Salerano al Lambro (Lo); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); Sti Solfotecnica Italiana Cotignola (Ra)

Taglie: 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 L

Partita n.:



ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo (H): H317 Può provocare una reazione allergica della pelle. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di prudenza (P): P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308 + 313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P393 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

SP1 - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

SPe3 - Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali

NORME PRECAUZIONALI Non entrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Nel caso di impieghi alla'aperto le quantità non possono superare 450 g/ha prochloraz per ogni applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tetraconazolo 3,9% e Procloraz 21,9% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Tetraconazolo:-----

Procloraz: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleeni.

CARATTERISTICHE

BREK duo è un fungicida endoterapico per la difesa dell'apparato aereo dei cereali. Combatte le malattie che colpiscono l'apparato fogliare e la spiga grazie all'associazione dei due principi attivi a differente meccanismo d'azione e spettro di attività; questo gli conferisce una grande elasticità d'impiego.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Frumento, Orzo

Il prodotto è indicato per il controllo dei seguenti patogeni:

Fusariosi, Oidio, Ruggini, Septorie, Elmintosporiosi, Rincosporiosi.

Dose d'impiego: 1.96 l/ha.

Nei trattamenti specifici contro le Fusariosi della spiga intervenire nella fase di inizio fioritura con il 10-15% delle antere fuoriuscite.

Per prevenire l'insorgenza di resistenza è ammesso un solo trattamento all'anno

COMPATIBILITA': Può essere associato ad erbicidi ormonici da usare su cereali alla medesima epoca, anche con l'aggiunta di fitoregolatori per la prevenzione dell'allettamento.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI entro la fine della fioritura per frumento e ad inizio spigatura: spiga appena visibile (60 giorni prima della raccolta) per orzo.

Il foraggio dei cereali trattati con questo prodotto non deve essere utilizzato per alimentazione animale.

RISCHI DI NOCIVITA': Non contaminare stagni, fossi, vie d'acqua con i residui di lavaggio delle attrezzature usate per il trattamento.

ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

AGITARE PRIMA DELL'USO

Distribuito da: Du Pont De Nemours Italiana Srl, via Pontaccio 10, Milano tel 800378337

Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 08/09/2020