

BROADWAY™

Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento tenero e duro, triticale e segale, efficace contro infestanti graminacee e dicotiledoni

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

Meccanismo d'azione (HRAC): Gruppo 2 (B)

Composizione di BROADWAY

Pyroxsulam g 68,3
Florasulam g 22,8
Cloquintocet mexyl g 68,3 (antidoto agronomico)
Coformulanti
q.b. a g 1000



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401:** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. **EUH208:** Contiene Pyroxsulan e Cloquintocet-mexyl. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P391:** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501:** Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Corteva Agriscience Italia s.r.l – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100
Cremona Tel. +39 0372 709900

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

Van Diest Supply – Webster City – USA
Corteva Agriscience LLC- El Paso-USA
Schirm GmbH – Lubeck (D)
TORRE srl- Torrenieri, Fraz. Montalcino (SI)-Italia
Diachem S.p.A. – U.P. Sifa – Caravaggio (BG) – Italia
Corteva Agriscience France S.A.S – Cernay – Francia
Arco Logistica S.r.l - Ferrara (FE) – Italia (solo ri-etichettatura)
SINTECO LOGISTICS S.p.A. – S.Giuliano Milanese (MI) – Italia (solo ri-etichettatura)
Taglie autorizzate: 0, 25 - 0,5 – 0,55 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 5,0 - 10 kg

Registrazione n. 13388 del 20/10/2010 del Ministero della Salute

Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le acque sotterranee, non applicare il prodotto su cereali vernini (dormienza). Per proteggere gli organismi acquatici non applicare il prodotto su suoli artificialmente drenati. Per proteggere gli organismi acquatici adottare una fascia di rispetto vegetata di 10 metri dai corpi superficiali. Indossare guanti durante la fase di miscelazione, carico ed applicazione del prodotto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Cure di sostegno. Trattamento basato sul giudizio del medico in base ai sintomi del paziente. **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITÀ D'AZIONE

BROADWAY è un erbicida sistemico selettivo di post-emergenza, assorbito da foglie e radici. L'erbicida viene traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema nei meristemi delle piante ed agisce come inibitore dell'enzima acetilattato sintasi (ALS). La crescita della pianta è rallentata già dopo poche ore, anche se l'effetto finale richiede qualche settimana.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

BROADWAY è un erbicida sistemico di post emergenza selettivo per frumento tenero e frumento duro, triticale e segale, efficace contro specie infestanti monocotiledoni e dicotiledoni.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili: attaccamano (*Galium aparine*), borsapastore (*Capsella bursa-pastoris*), camomilla (*Matricaria chamomilla*), centocchio (*Stellaria media*), coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), forasacco peloso (*Bromus mollis*), gallio coriandolino (*Galium tricornutum*), loglio (*Lolium multiflorum*), papavero (*Papaver rhoeas*), ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), senape selvatica (*Sinapis arvensis*), veronica (*Veronica spp.*), viola dei campi (*Viola arvensis*) capellini dei campi (*Apera spica venti*)

Infestanti mediamente sensibili: avena (*Avena spp.*), forasacco (*Bromus spp.*), correggiola (*Polygonum aviculare*), falsa ortica purpurea (*Lamium purpureum*), scagliola (*Phalaris spp.*)

DOSE D'IMPIEGO: 275 grammi per ettaro

EPOCA D'IMPIEGO

BROADWAY può essere applicato dallo stadio di inizio accestimento al secondo nodo del cereale. In periodi piovosi o di freddo intenso evitare di applicare il prodotto prima della fase di pieno accestimento della coltura.

Per ottenere i migliori risultati si consiglia di intervenire su infestanti ai primi stadi di sviluppo ed in attiva crescita (in particolare per avena e scagliola applicare non oltre la fase di inizio accestimento).

Note: Non applicare il prodotto quando le colture sono sotto stress, causato da freddo, siccità, ristagno, carenze nutrizionali, ecc. In caso di condizioni climatiche avverse, caratterizzate da una forte escursione termica e da basse temperature, potrebbero verificarsi dei temporanei rallentamenti nella crescita della coltura che non pregiudicano la produzione finale.

Effettuare un solo trattamento per ciclo colturale.

Coltura	Dose per ettaro	Volumi d'acqua	Numero massimo di trattamenti per ciclo colturale	Intervallo di sicurezza
Frumento duro, frumento tenero, triticale, segale	275 g/ha	100-400 l/ha	1	-

(Broadway – continua a pag. 2)

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

E' possibile utilizzare BROADWAY con il bagnante CODACIDE alle dosi indicate in etichetta.

Prima di eseguire l'applicazione assicurarsi che l'attrezzatura sia in buone condizioni, efficiente e sia stata calibrata secondo le indicazioni del costruttore.

Il trattamento è da eseguire utilizzando 100 – 400 litri d'acqua ad ettaro, secondo le attrezzature impiegate, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Il volume inferiore è da utilizzare solo su coltura ancora aperta ed infestanti piccole.

Versare BROADWAY lentamente nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà, con l'agitatore in movimento. Portare a volume il serbatoio ed aggiungere l'eventuale bagnante alla fine, con l'agitatore in movimento. Nel corso del trattamento mantenere in funzione l'agitatore anche durante eventuali soste con irroratrice chiusa. Qualora l'irroratrice sia dotata di premiscelatore, utilizzare il sistema venturi di aspirazione in botte (meglio conosciuto come "aspira-prodotti").

Note: La pioggia caduta dopo un'ora dall'applicazione non compromette l'efficacia del prodotto.

COLTURE IN SUCCESSIONE

In base alle buone pratiche agricole e seguendo la normale rotazione, dopo la raccolta del cereale trattato con BROADWAY, non ci sono particolari limitazioni per le colture in successione.

DISTRUZIONE ACCIDENTALE DELLA COLTURA

In caso di distruzione accidentale della coltura per avversità meteorologiche, attacchi parassitari ecc. è possibile seminare mais, sorgo e graminacee dopo sei settimane dall'applicazione, avendo cura di effettuare un'aratura prima della semina.

COMPATIBILITÀ:

Per evitare danni alla coltura, non utilizzare BROADWAY in miscela con:

- a) Regolatori di crescita (l'intervallo minimo richiesto è di 7 giorni).
- b) Insetticidi fosfororganici (l'intervallo minimo richiesto è di 14 giorni).

AVVERTENZA:

In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ:

Il prodotto può essere fitotossico per le colture NON indicate in etichetta. In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutto, ortaggi e floreali in genere. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con le colture agricole, orticole, vivai e giardini, anche sotto forma di deriva portata dal vento. Applicare una fascia di rispetto di 5 metri da colture sensibili a florasulam.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE

Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione.

A questo scopo si raccomanda l'impiego di un detergente specifico per il lavaggio di attrezzature agricole ed irroratrici attenendosi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate nell'etichetta di tale prodotto.

GESTIONE DELLA RESISTENZA

L'uso ripetuto di prodotti con il medesimo meccanismo d'azione può determinare la selezione di infestanti resistenti. Per prevenire o ritardare tale selezione è raccomandabile utilizzare un programma di diserbo con diversi meccanismi d'azione e di utilizzare gli erbicidi nello stadio ottimale, quando le infestanti sono piccole ed in attiva crescita, evitando le condizioni sfavorevoli (freddo, siccità, ristagno, ecc.). Pyroxsulam e florasulam sono due triazolopirimidine il cui meccanismo di azione appartiene al gruppo "2 (B) – inibitori dell'acelattato sintetasi ALS", secondo la classificazione HRAC. Pertanto non deve essere utilizzato più di una volta per stagione e non deve essere applicato in sequenza ad altri erbicidi aventi lo stesso meccanismo d'azione. E' possibile miscelare BROADWAY con altri prodotti con meccanismo d'azione ALS per allargarne lo spettro d'azione. In presenza di infestanti a ridotta sensibilità raccomandiamo di miscelare o alternare il prodotto con erbicidi a diverso meccanismo d'azione.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non richiesto

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare:
0039-0372 709900/ 709999 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 07/08/2024 e modificata ai sensi dell'art.7 comma 1, D.P.R. n. 55/2012 con validità dal 01/10/2024