

CURZATE SYSTEM

Fungicida antiperonosporico ad azione sistemica e citotropica in polvere bagnabile

Meccanismo d'azione: Gruppo P, Gruppo U (FRAC)

CURZATE SYSTEM

Composizione

100 grammi di prodotto contengono	
Fosetil Alluminio puro	g 60
Cimoxanil puro	g 4
coformulanti q.b. a	g 100

Fraresi di Rischio

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H318: Provoca gravi lesioni oculari; H361fd: Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH 401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di Prudenza

P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P333+P313: In caso di irritazione o eruzione cutanea della pelle: consultare un medico; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione nazionale.



PERICOLO

Titolare della registrazione

SCAM S.p.A. Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena - Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione

SCAM S.p.A. - Modena DIACHEM S.p.A. - Unità produttiva SIFA - CARAVAGGIO - Via Mozzanica, 9-11 24043 Caravaggio (BG)

Distribuito da

Corteva Agriscienze Italia S.r.l.

Via dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona (CR) Italia
Tel.: +39 0372 709900

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12044 del 16/04/2004

Contenuto netto: Kg 0,500 - 1 - 2,5 - 5 - 10

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Usare abiti da lavoro, guanti e maschera del tipo FP2 durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto. Durante l'applicazione del prodotto in campo e in serra indossare sempre abiti da lavoro, guanti e una occhiali protettivi. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le attività di ispezione, mantenimento e raccolta in campo e in serra indossare abiti da lavoro e guanti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO puro 60%; CIMOXANIL puro 4%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO - **Sintomi:** --- CIMOXANIL derivato dall'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** === **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

CURZATE SYSTEM è un fungicida antiperonosporico che unisce le proprietà sistemiche del Fosetil Alluminio a quelle citotropiche del Cimoxanil. CURZATE SYSTEM possiede attività preventiva e curativa, essendo in grado di inibire lo sviluppo del patogeno entro 2-3 giorni dal momento dell'infezione. CURZATE SYSTEM è caratterizzato da una buona persistenza d'azione che gli consente di proteggere sia la vegetazione presente al momento del trattamento che quella formatasi successivamente.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: CURZATE SYSTEM può essere impiegato sulle seguenti colture:

Vite: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) alla dose di 2,5 kg/ha, in miscela con un prodotto a differente meccanismo d'azione. Iniziare gli interventi quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione e proseguirli ad intervalli di 10-12 giorni. Nei casi di forte pressione della malattia in concomitanza delle fasi fenologiche di maggiore sensibilità della vite (pre-fioritura, sfioritura) può risultare opportuno ridurre l'intervallo fra i trattamenti a 10 giorni. Non effettuare più di 4 trattamenti l'anno.

Pomodoro: contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*) in campo e in serra alla dose di 2,5 kg/ha, in miscela con un prodotto a differente meccanismo d'azione, iniziando i trattamenti in concomitanza con il verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno e proseguendoli ad intervalli di 8-12 giorni in funzione dell'andamento stagionale e della virulenza della malattia. Non effettuare più di 3 trattamenti l'anno.

COMPATIBILITÀ: il prodotto non è miscibile con i preparati fitosanitari a reazione alcalina. Non è compatibile con formulati rameici. Non utilizzare CURZATE SYSTEM in miscela con concimi fogliari contenenti alti titoli di azoto. Verificarne la compatibilità e la selettività in utilizzo associato a biostimolanti e fitoregolatori. Non applicare in combinazione (o a ridosso di trattamenti) con formulati a base oleosa o olii minerali o vegetali.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Lasciar trascorrere 30 giorni dopo la raccolta delle colture erbacee trattate prima di seminare altre colture.

GESTIONE DELLE RESISTENZE: Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare CURZATE SYSTEM ad altri fungicidi aventi differente meccanismo d'azione.

INTERVALLO DI SICUREZZA: osservare un intervallo di 40 giorni fra l'ultimo trattamento e la raccolta della Vite, 20 giorni per Pomodoro.

CONSERVAZIONE: Non conservare a temperature superiori a 40°C.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

CURZATE SYSTEM

Fungicida antiperonosporico ad azione sistemica e citotropica in polvere bagnabile

Meccanismo d'azione: Gruppo P, Gruppo U (FRAC)

CURZATE SYSTEM

Composizione

100 grammi di prodotto contengono	
Fosetil Alluminio puro	g 60
Cimoxanil puro	g 4
coformulanti q.b. a	g 100

Frasi di Rischio

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H318: Provoca gravi lesioni oculari; H361fd: Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH 401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di Prudenza

P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P333+P313: In caso di irritazione o eruzione cutanea della pelle: consultare un medico; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione nazionale.



PERICOLO

Titolare della registrazione

SCAM S.p.A. Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena - Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione

SCAM S.p.A. - Modena DIACHEM S.p.A. - Unità produttiva SIFA - CARAVAGGIO - Via Mozzanica, 9-11 24043 Caravaggio (BG)

Distribuito da

Corteva Agriscienze Italia S.r.l.

Via dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona (CR) Italia
Tel.: +39 0372 709900

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12044 del 16/04/2004

Contenuto netto: Kg 2,5 (5 s.i. da g 500)

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Usare abiti da lavoro, guanti e maschera del tipo FP2 durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto. Durante l'applicazione del prodotto in campo e in serra indossare sempre abiti da lavoro, guanti e una occhiali protettivi. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le attività di ispezione, mantenimento e raccolta in campo e in serra indossare abiti da lavoro e guanti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO puro 60%; CIMOXANIL puro 4%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: FOSETIL ALLUMINIO - **Sintomi:** --- CIMOXANIL derivato dall'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** === **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

CURZATE SYSTEM è un fungicida antiperonosporico che unisce le proprietà sistemiche del Fosetil Alluminio a quelle citotropiche del Cimoxanil. CURZATE SYSTEM possiede attività preventiva e curativa, essendo in grado di inibire lo sviluppo del patogeno entro 2-3 giorni dal momento dell'infezione. CURZATE SYSTEM è caratterizzato da una buona persistenza d'azione che gli consente di proteggere sia la vegetazione presente al momento del trattamento che quella formatasi successivamente.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO: CURZATE SYSTEM può essere impiegato sulle seguenti colture:

Vite: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) alla dose di 2,5 kg/ha, in miscela con un prodotto a differente meccanismo d'azione. Iniziare gli interventi quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione e proseguirli ad intervalli di 10-12 giorni. Nei casi di forte pressione della malattia in concomitanza delle fasi fenologiche di maggiore sensibilità della vite (pre-fioritura, sfioritura) può risultare opportuno ridurre l'intervallo fra i trattamenti a 10 giorni. Non effettuare più di 4 trattamenti l'anno.

Pomodoro: contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*) in campo e in serra alla dose di 2,5 kg/ha, in miscela con un prodotto a differente meccanismo d'azione, iniziando i trattamenti in concomitanza con il verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno e proseguendoli ad intervalli di 8-12 giorni in funzione dell'andamento stagionale e della virulenza della malattia. Non effettuare più di 3 trattamenti l'anno.

COMPATIBILITÀ: il prodotto non è miscibile con i preparati fitosanitari a reazione alcalina. Non è compatibile con formulati rameici. Non utilizzare CURZATE SYSTEM in miscela con concimi fogliari contenenti alti titoli di azoto. Verificarne la compatibilità e la selettività in utilizzo associato a biostimolanti e fitoregolatori. Non applicare in combinazione (o a ridosso di trattamenti) con formulati a base oleosa o olii minerali o vegetali.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Lasciar trascorrere 30 giorni dopo la raccolta delle colture erbacee trattate prima di seminare altre colture.


GESTIONE DELLE RESISTENZE: Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare CURZATE SYSTEM ad altri fungicidi aventi differente meccanismo d'azione.

INTERVALLO DI SICUREZZA: osservare un intervallo di 40 giorni fra l'ultimo trattamento e la raccolta della Vite, 20 giorni per Pomodoro.


CONSERVAZIONE: Non conservare a temperature superiori a 40°C.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.



1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua




2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti



3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore



4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...



5) ... aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

CURZATE SYSTEM

Fungicida antiperonosporico ad azione sistemica e citotropica in polvere bagnabile
sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Fosetil Alluminio puro	g	60
Cimoxanil puro	g	4
Coformulanti q.b. a	g	100



PERICOLO

Da sciogliere in acqua senza rompere

Contenuto netto: 500 g

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione prima di utilizzare il prodotto

DANON VENDERE NÉ CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

**Titolare della Registrazione
SCAM S.p.A.**

Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena - Tel. 059-586511

Registrazione del Ministero della Salute n. 12044 del 16/04/2004