

Ariane™ II

ERBICIDA

L'ERBICIDA RISOLUTIVO



**ERBICIDA SISTEMICO SELETTIVO
PER FRUMENTO TENERO E DURO,
ORZO, SEGALE, AVENA E TRITICALE**

Ariane II è un erbicida selettivo di post-emergenza per frumento duro e tenero, orzo, avena, triticale e segale.

Attraverso l'attività sistemica e la sinergia dei tre principi attivi in perfetta combinazione tra di loro, si ottiene un controllo completo di tutte le infestanti dicotiledoni dei cereali comprese le più difficili e le perennanti.

I vantaggi di Ariane II:

- ✓ Rapido assorbimento e velocità d'azione
- ✓ Traslocazione floematica e xilematica ai siti d'azione
- ✓ Ampio spettro d'azione
- ✓ Adatto per applicazioni tardive
- ✓ Progressiva e rapida devitalizzazione che conduce al completo disseccamento delle infestanti colpite

Spettro d'azione:

COMPOSITE <i>Anagallis arvensis</i> <i>Anthemis arvensis</i> <i>Centaurea cyanus</i> <i>Chrysanthemum segetum</i> <i>Cirsium arvense</i> <i>Matricaria chamomilla</i> <i>Polygonum convolvulus</i> <i>Silybum marianum</i> <i>Solanum nigrum</i>	CRUCIFERE <i>Capsella bursa-pastoris</i> <i>Raphanus raphanistrum</i> <i>Sinapis arvensis</i> <i>Thlaspi arvense</i>	PAPAVERACEE <i>Fumaria officinalis</i> <i>Papaver rhoeas</i>	BORAGINACEE <i>Myosotis arvensis</i>
RUBIACEE <i>Galium aparine</i>	SCROFULARIACEE <i>Veronica arvensis</i> <i>Veronica hederifolia</i> <i>Veronica persica</i>	POLYGONACEE <i>Rumex crispus</i> <i>Rumex obtusifolius Sensibile</i>	CONVOLVULACEE <i>Convolvulus arvensis</i>
	CARCIOFILACEE <i>Stellaria media</i>	LABIATE <i>Galeopsis tetrahit</i> <i>Lamium spp.</i>	LEGUMINOSE <i>Vicia spp.</i>



**EFFICACIA SVINCOLATA DALLE
TEMPERATURE:
ATTIVO GIÀ A 10°C
E FINO A 25°C**

**EFFICACIA INALTERATA
IN CASO DI PRECIPITAZIONI:
VIENE ASSORBITO GIÀ 1 ORA
DOPO L'APPLICAZIONE**

**L'UNICO DICOTILEDONICIDA
RISOLUTIVO
CONTRO
INFESTANTI PERENNI**



Cirsium arvense




Sylibum marianum



Convolvulus arvensis

Epoca e dose su cereali:

La grande efficacia ai diversi stadi di sviluppo delle infestanti, consente di avere un'ampia finestra di intervento che si estende dall'inizio dell'accestimento al secondo nodo, fornendo così massima flessibilità.



DOSE	VOLUME DI ACQUA	NOTE
3,5-4,0 L/ha	200-400 L/ha	La dose più alta va usata in presenza di basse temperature (meno di 10°C medi giornalieri) e di infestanti «difficili», quali borsa pastore (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), camomilla comune (<i>Matricaria chamomilla</i>), papavero (<i>Papaver spp.</i>), veronica (<i>Veronica spp.</i>). È consentito un solo trattamento

Ariane™ II**ERBICIDA****COMPOSIZIONE:**

Fluroxipir
meptil-epil estere puro..... 5,3 g
(57,6 g/l, pari a 40 g/l di acido equivalente)

Clopiralid
sale di monoetanolammonio puro..... 2,4 g
(26,4 g/l, pari a 20 g/l di acido equivalente)

MCPA
sale potassico puro21,9 g
(238,1 g/l, pari a 200 g/l di acido equivalente)

Coformulantiq.b. a g 100

FORMULAZIONE:

emulsione olio/acqua (EW)

CONFEZIONE:

Bottiglia da 5 L (X4)

REGISTRAZIONE:

N° 8376 del 07/08/1993

GRUPPO HRAC: O

GRUPPO HRAC/WSSA: 4

INTERVALLO DI SICUREZZA:

70 giorni

CLASSIFICAZIONE:

ATTENZIONE

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL'APPLICAZIONE
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute.
Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.

®, ™ Marchi commerciali di Corteva Agriscience e compagnie affiliate. © 2022 Corteva.