

**Ariane™ II**

**ERBICIDA**

**L'ERBICIDA RISOLUTIVO**



**ERBICIDA SISTEMICO SELETTIVO  
PER FRUMENTO TENERO E DURO,  
ORZO, SEGALE, AVENA E TRITICALE**

Ariane II è un erbicida selettivo di post-emergenza per frumento duro e tenero, orzo, avena, triticale e segale.

Attraverso l'attività sistemica e la sinergia dei tre principi attivi in perfetta combinazione tra di loro, si ottiene un controllo completo di tutte le infestanti dicotiledoni dei cereali comprese le più difficili e le perennanti.

## I vantaggi di Ariane II:

- ✓ Rapido assorbimento e velocità d'azione
- ✓ Traslocazione floematica e xilematica ai siti d'azione
- ✓ Ampio spettro d'azione
- ✓ Adatto per applicazioni tardive
- ✓ Progressiva e rapida devitalizzazione che conduce al completo disseccamento delle infestanti colpite

## Spettro d'azione:

<p><b>COMPOSITE</b></p> <p><i>Anagallis arvensis</i>  <i>Anthemis arvensis</i>  <i>Centaurea cyanus</i>  <i>Chrysanthemum segetum</i>  <i>Cirsium arvense</i>  <i>Matricaria chamomilla</i>  <i>Polygonum convolvulus</i>  <i>Silybum marianum</i>  <i>Solanum nigrum</i>  <i>Artemisia vulgaris*</i>  <i>Bidens spp.*</i>  <i>Calendula officinalis*</i>  <i>Carduus spp.*</i>  <i>Galinsoga parviflora*</i>  <i>Helianthus spp.*</i>  <i>Lactuca serriola*</i>  <i>Picris echioides*</i>  <i>Senecio vulgaris*</i>  <i>Sonchus spp.*</i>  <i>Taraxacum officinale*</i>  <i>Tussilago farfara*</i>  <i>Xanthium spp.*</i></p>	<p><b>LABIATE</b></p> <p><i>Galeopsis spp.</i>  <i>Lamium spp.</i>  <i>Stachys arvensis*</i></p>	<p><b>CRUCIFERE</b></p> <p><i>Capsella bursa-pastoris</i>  <i>Raphanus raphanistrum</i>  <i>Sinapis arvensis</i>  <i>Thlaspi arvense</i>  <i>Brassica spp.*</i>  <i>Cardaria draba*</i>  <i>Cardamine hirsuta*</i>  <i>Diplotaxis erucoides*</i>  <i>Eruca sativa*</i>  <i>Myagrum perfoliatum*</i>  <i>Rapistrum rugosum*</i></p>	<p><b>POLIGONACEE</b></p> <p><i>Rumex crispus</i>  <i>Rumex obtusifolius Sensibile</i>  <i>Fallopia convolvulus*</i>  <i>Polygonum lapathifolium*</i></p>
<p><b>BORAGINACEE</b></p> <p><i>Myosotis arvensis</i>  <i>Borago officinalis*</i>  <i>Heliotropium europaeum*</i></p>	<p><b>CARCIOFILACEE</b></p> <p><i>Stellaria media</i>  <i>Cerastium arvense*</i>  <i>Spergula arvensis*</i></p>	<p><b>SCROFULARIACEE</b></p> <p><i>Veronica arvensis</i>  <i>Veronica hederifolia</i>  <i>Veronica persica</i></p>	<p><b>RANUNCULACEE</b></p> <p><i>Adonis aestivalis*</i>  <i>Nigella arvensis*</i>  <i>Ranunculus spp.*</i></p>
<p><b>MALVACEE</b></p> <p><i>Abutilon theophrasti*</i>  <i>Hibiscus spp.*</i>  <i>Malva spp.*</i></p>	<p><b>PAPAVERACEE</b></p> <p><i>Fumaria officinalis</i>  <i>Papaver rhoeas</i></p>	<p><b>LEGUMINOSE</b></p> <p><i>Vicia spp.</i>  <i>Medicago spp.*</i>  <i>Trifolium spp.*</i></p>	<p><b>CONVOLVULACEE</b></p> <p><i>Convolvulus arvensis</i>  <i>Calystegia sepium*</i></p>
<p><b>RUBIACEE</b></p> <p><i>Galium aparine</i></p>	<p>* da evidenze sperimentali di Corteva Agriscience</p>		


**EFFICACIA SVINCOLATA DALLE  
TEMPERATURE:  
ATTIVO GIÀ A 10°C  
E FINO A 25°C**

**EFFICACIA INALTERATA  
IN CASO DI PRECIPITAZIONI:  
VIENE ASSORBITO GIÀ 1 ORA  
DOPO L'APPLICAZIONE**

**L'UNICO DICOTILEDONICA  
RISOLUTIVO  
CONTRO  
INFESTANTI PERENNI**



*Cirsium arvense*




*Sylibum marianum*



*Convolvulus arvensis*

### Epoca e dose su cereali:

La grande efficacia ai diversi stadi di sviluppo delle infestanti, consente di avere un'ampia finestra di intervento che si estende dall'inizio dell'accestimento al secondo nodo, fornendo così massima flessibilità.



DOSE	VOLUME DI ACQUA	NOTE
3,5-4,0 L/ha	200-400 L/ha	<p>La dose più alta va usata in presenza di basse temperature (meno di 10°C medi giornalieri) e di infestanti «difficili», quali borsa pastore (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), camomilla comune (<i>Matricaria chamomilla</i>), papavero (<i>Papaver spp.</i>), veronica (<i>Veronica spp.</i>).</p> <p><b>È consentito un solo trattamento</b></p>

**Ariane™ II****ERBICIDA****COMPOSIZIONE:**

Fluroxipir  
meptil-eptil estere puro..... 5,3 g  
(57,6 g/l, pari a 40 g/l di acido equivalente)

Clopiralid  
sale di monoetanolammonio puro..... 2,4 g  
(26,4 g/l, pari a 20 g/l di acido equivalente)

MCPA  
sale potassico puro .....21,9 g  
(238,1 g/l, pari a 200 g/l di acido equivalente)

Coformulanti .....q.b. a g 100

**FORMULAZIONE:**

emulsione olio/acqua (EW)

**CONFEZIONE:**

Bottiglia da 5 L (X4)

**REGISTRAZIONE:**

N° 8376 del 07/08/1993

**GRUPPO HRAC:** O

**GRUPPO HRAC/WSSA:** 4

**INTERVALLO DI SICUREZZA:**

70 giorni

**CLASSIFICAZIONE:****ATTENZIONE**

**H317:** Può provocare una reazione allergica cutanea.

**H319:** Provoca grave irritazione oculare.

**H410:** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**EUH401:** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute.  
Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.

®, ™ Marchi commerciali di Corteva Agriscience e compagnie affiliate. © 2021 Corteva.