

Abbatti le malerbe



Novixid[®]

Rinskor™ active

ERBICIDA

E vinci la partita

Aiutiamo a coltivare il futuro per le generazioni di domani

Grazie all'innovativa molecola di Rinskor™ Active e all'efficacia dimostrata della sua formulazione, Novixid è la mossa finale che risolverà i tuoi problemi con le infestanti, migliorando la redditività del tuo raccolto in modo più efficiente e sostenibile.

Completa l'opera con un colpo eccezionale!

- Ampio spettro d'azione
- Eccellente efficacia su ciperacee e foglie larghe
- Migliore gestione e prevenzione contro le infestanti resistenti (varietà convenzionali e tolleranti)
- Completa il controllo delle infestanti difficili

E vinci la partita

Novixid è il nuovo erbicida specifico ad ampio spettro, specifico per il riso per il controllo di giavoni, ciperacee, alismatacee e foglie larghe, anche quelle se resistenti agli erbicidi attualmente in commercio.

Novixid è l'erbicida ideale per il trattamento di rifinitura in un programma di controllo delle infestanti che prevede almeno due interventi.

Novixid può essere usato sia nelle semina tradizionale che in quella interrata a file, sia per le varietà convenzionali che quelle tolleranti agli erbicidi, in particolare quelle tolleranti agli imidazolinoni (ad es. imazamox)

COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

Miscela pronta di Rinskor active 12,5 g/L e Penoxsulam 20 g/L in formulazione liquida (NeoEC, concentrato emulsionabile), che non contiene distillati del petrolio. Presenta già al suo interno un bagnante (olio metilato di soia) che ne ottimizza le prestazioni in termini di efficacia, selettività e affidabilità.

SPETTRO D'AZIONE

Efficace nei confronti di infestanti annuali quali giavoni, ciperacee, alismatacee ed altre infestanti a foglia larga.

Specie Sensibili:

Ammania (*Ammannia coccinea*), Cucchiaino (*Alisma plantago-aquatica*), Erba miseria delle risaie (*Murdannia keisak*), Eterantera reniforme (*Heteranthera reniformis*), Forbicine d'acqua (*Bidens spp.*), Poligoni (*Polygonum spp.*), Zigolo delle risaie (*Cyperus difformis*), Giavone "rosso" (*Echinochloa crus-galli*), Giavoni "bianchi" (*Echinochloa spp.*)

Specie Moderatamente Sensibili:

Lisca marittima (*Bolboschoenus maritimus*), Giunco fiorito (*Butomus umbellatus*), Quadrettone (*Schoenoplectus mucronatus*) da seme.

DOSE E MISCIBILITÀ

Applicare **Novixid** alla dose di 2,0 l/ha, una sola volta per stagione, in post-emergenza del riso e delle infestanti.

EPOCA DI APPLICAZIONE

Novixid può essere usato in post-emergenza del riso dallo stadio di 2-3 foglie fino all'inizio dell'allungamento dello stelo.

SELETTIVITÀ

Novixid è selettivo sulla maggior parte delle varietà di riso attualmente coltivate, da 2-3 foglie vere fino all'inizio dell'allungamento dello stelo della coltura, indipendentemente dal tipo di suolo e dalle pratiche colturali utilizzate.

INTERVALLO DI SICUREZZA

60 giorni prima della raccolta



Registrazione: N° 18460 del 06/09/2023 del Ministero della Salute