




**Senior<sup>®</sup> 75 WG**

**ERBICIDA**

**IL GRAMINICIDA CHE TI AIUTA  
A PRODURRE MEGLIO**




**Erbicida selettivo ad ampio spettro  
d'azione efficace su graminacee**

-  Più efficacia
-  Ampio spettro d'azione
-  Flessibilità d'uso

**Senior® 75 WG:** è il nuovo graminicida di Corteva agriscience™ contenente il principio pyroxsulam efficace sulle principali graminacee (avena, loglio, scagliola, forasacco e coda di volpe) che possiede, in combinazione con altri erbicidi a diverso meccanismo d'azione, anche un'ottima attività su alcune foglie larghe (attaccamani\*, **viola\***, **veronica\*** e geranio\*) per frumento tenero e duro.

## Epoca e modalità di impiego:

L'epoca ottimale di applicazione di **Senior® 75 WG** è durante l'accestimento della coltura dallo stadio di inizio accestimento al primo nodo del cereale. Il controllo ottimale delle infestanti graminacee si raggiunge nella fase fenologica di 3-5 foglie vere.



DOSE	VOLUME DI ACQUA	NOTE
0,25 Kg/ha**	200-300 L/ha	Non applicare il prodotto quando le colture sono sotto stress, causato da freddo, siccità, ristagno, carenze nutrizionali, ecc. In caso di condizioni climatiche avverse, caratterizzate da una forte escursione termica e da basse temperature, potrebbero verificarsi dei temporanei rallentamenti nella crescita della coltura che non pregiudicano la produzione finale. <b>Il prodotto è fitotossico su orzo.</b>

\*\* + bagnante specifico

## Spettro d'azione:

**Infestanti sensibili:** coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), avena selvatica (*Avena spp.*), forasacco (*Bromus mollis*), loglio (*Lolium spp.*).

**Infestanti mediamente sensibili:** scagliola (*Phalaris spp.*).

## Selettività:

**Senior® 75 WG** è selettivo per frumento tenero e duro.



\* I dati sperimentali riportano la buona efficacia anche su altre malerbe non menzionate sull'etichetta attualmente autorizzata

**Miscibilità:**

**Senior® 75 WG** è miscibile con erbicidi contro infestanti a foglia larga, in modo di ampliare il suo spettro d'azione.

- Non miscelare con regolatori di crescita
- Non miscelare con insetticidi fosfororganici

**Colture in successione:**

In base alle buone pratiche agricole e seguendo la normale rotazione, dopo la raccolta del cereale trattato con **Senior® 75 WG**, non ci sono particolari limitazioni per le colture in successione.

Si raccomanda un intervallo minimo di 4 mesi dopo l'applicazione di **Senior® 75 WG** per colture sensibili quali **leguminose**.

**LINEA DIAMANTE**

La soluzione migliore con un effetto potenziato su **GRAMINACEE** e **FOGLIE LARGHE**.




In caso di infestazione mista con graminacee, foglie larghe annuali (papavero, camomilla, senape, attaccamani, fumaria e altre), **biotipi resistenti di papavero** e perennanti in stadi precoci (cardo, stoppione).

**Senior® 75 WG + Zypar® + bagnante specifico** è la soluzione migliore per costo beneficio ed efficacia.

**LINEA SMERALDO**

La soluzione migliore per **GRAMINACEE E PERENNANTI**.




In caso di infestazione mista, con **graminacee, foglie larghe annuali ma soprattutto perennanti** (cardo, stoppione, poligonacee, fiordaliso e crisantemo)

**anche in stadi tardivi.**

**Senior® 75 WG + Columbus® + bagnante specifico** è la soluzione migliore per costo beneficio ed efficacia.

**LINEA RUBINO**

La soluzione migliore per **GRAMINACEE, PAPAVERO** e **CRUCIFERE** (anche resistenti).



In caso di infestazione mista con graminacee, papavero e **senape (anche resistente)**.

**Senior® 75 WG + Zenith® + bagnante specifico** è la soluzione migliore per costo beneficio ed efficacia.

**LINEA GOLD**

La soluzione migliore per **GRAMINACEE, ATTACCAMANI** e **CAMOMILLA**.



In caso di infestazione mista con graminacee, attaccamani e camomilla.

**Senior® 75 WG + Zenith® Gold + bagnante specifico** è la soluzione migliore per costo beneficio ed efficacia.

# Senior® 75 WG

## ERBICIDA

### COMPOSIZIONE:

Pyroxsulam puro.....g 75  
Cloquintocet-mexyl.....g 75  
Coformulanti.....q.b. a g1000

### FORMULAZIONE:

Granuli idrodispersibili (WG)

### CONFEZIONE:

Bottiglia da 0,5 e da 1 Kg

### REGISTRAZIONE:

N° 17320 del 5 giugno 2019

### GRUPPO HRAC:

B

### INTERVALLO DI SICUREZZA:

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

### CLASSIFICAZIONE:



### ATTENZIONE

**H410:** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**EUH208:** Contiene Pyroxsulam e Cloquintocet-mexyl. Può provocare una reazione allergica.

**EUH401:** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL'APPLICAZIONE  
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute.  
Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.

®, ™ Marchi commerciali di Corteva Agriscience e compagnie affiliate. © 2021 Corteva.