



ZORVEC™
Zelavin® Vel

FUNGICIDA

ZORVEC™
Zelavin® Bria

FUNGICIDA

THIS CHANGES EVERYTHING

**UNA MIGLIORE GESTIONE
DELLA COLTURA PER
UN BUSINESS DI QUALITÀ**

Coltivare uva di qualità è molto difficile e nel contempo limitarne i costi di produzione è ancora più complesso. L'ottimizzazione della gestione dell'azienda e delle colture è la sfida principale per i viticoltori. I nuovi Zorvec Zelavin® Vel e Zorvec Zelavin® Bria offrono un'ineguagliabile combinazione d'uniformità d'azione e controllo della peronospora che consentono di ottenere un raccolto migliore in ogni stagione, anche in condizioni ambientali critiche.

Zorvec Zelavin® Vel e Zorvec Zelavin® Bria

Caratteristiche principali di Zorvec Zelavin® Vel e Zorvec Zelavin® Bria


Prodotto	Zorvec Zelavin® Vel	Zorvec Zelavin® Bria
Componenti	Zorvec®: marchio registrato della sostanza attiva <i>Oxathiapiprolin</i> Movida®: marchio registrato del prodotto contenente <i>Zoxamide*</i>	Zorvec®: marchio registrato della sostanza attiva <i>Oxathiapiprolin</i> *Flovine®: marchio registrato del prodotto contenente <i>Folpet</i>
Meccanismo d'azione di Zorvec Zelavin®	OSBPI (inibitore della proteina OSBP legante l'ossisterolo)	
Classificazione FRAC	Zorvec Zelavin®: Gruppo 49 (F9) Movida®: Gruppo 22	Zorvec Zelavin®: Gruppo 49 (F9) Flovine®: Gruppo M4
Formulazione	Zorvec Zelavin®: Dispersione oleosa (OD) Movida®: Sospensione concentrata (SC)	Zorvec Zelavin®: Dispersione oleosa (OD) Flovine®: Granuli idrodispersibili (WDG)
Composizione	Zorvec Zelavin® (<i>Oxathiapiprolin</i>): 10% Movida® (<i>Zoxamide</i>): 24%	Zorvec Zelavin® (<i>Oxathiapiprolin</i>): 10% Flovine® (<i>Folpet</i>): 80%
Coltura	Vite da vino e da tavola	
Patogeno controllato	<i>Plasmopara viticola</i>	
Metodo d'applicazione	Applicazione fogliare	
Numero d'applicazioni	2 applicazioni per stagione	
Dose d'applicazione ad ettaro	0,2 L/ha di Zorvec Zelavin® + 0,625 L/ha di Movida®	Per volumi d'acqua di 1000 L/ha: 0,2 L di Zorvec Zelavin® + 1,25 Kg di Flovine®
Intervallo applicativo	10 giorni	
Confezione co-pack	1 ha e 4 ha	4 ha

* ZOXAMIDE sostanza attiva originale di Gowan Crop Protection Limited. Movida®: marchio registrato Gowan Italia.



Benefici e punti di forza di Zorvec Zelavin® Vel e Zorvec Zelavin® Bria

NESSUNA RESISTENZA INCROCIATA CON GLI ALTRI FUNGICIDI IN COMMERCIO



- Offre ai viticoltori un nuovo strumento per combattere la peronospora della vite.
- Assicura una migliore efficacia e una maggiore durata del controllo.

RESISTENZA AL DILAVAMENTO DOPO MENO DI UN'ORA DALL'APPLICAZIONE



- Flessibilità d'applicazione: utile quando le condizioni climatiche ritardano l'epoca d'intervento.
- Evita di fare ripetere il trattamento in caso di pioggia.

PROTEZIONE DEI NUOVI GERMOGLI



- Movimento sistemico acropeto verso foglie, germogli e grappoli.
- Essenziale per massimizzare la protezione della coltura e la sua resa.

- Nuova famiglia chimica
- Nuovo sito e nuovo meccanismo di azione.
- Nuovo gruppo FRAC
- Compatibilità fisica e chimica con i più noti agrofarmaci.
- Spiccata attività biologica (EC50 bassissima).

- Termostabile e fotostabile
- Alto coefficiente di ripartizione (3.67)
Elevatissima capacità di legarsi alle cere.
- Intervallo applicativo su vite di 10 gg.
- 2 applicazioni/anno per la vite da vino e tavola.

Gestione della resistenza


Strategia	Tattiche
Limitare l'esposizione	<ul style="list-style-type: none"> • Limitare il numero d'applicazioni a un massimo di 2 a stagione e alternare con fungicidi a diverso meccanismo d'azione. • Preferire le applicazioni in blocchi di due a quelle alternate. • Applicare preventivamente. • Rispettare sempre l'intervallo d'applicazione raccomandato.
Rallentare la crescita del patogeno	<ul style="list-style-type: none"> • Seguire il più possibile la profilassi. • Applicare sempre Zorvec Zelavin® in miscela con Movida® o Flovine®.
Contenere gli isolati resistenti: <ul style="list-style-type: none"> • Ridurre la sopravvivenza • Ridurre la diffusione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dopo i due trattamenti con Zorvec Zelavin® Vel e Zorvec Zelavin® Bria trattare con un prodotto a diverso meccanismo d'azione. • Utilizzare Zorvec Zelavin® Vel e Zorvec Zelavin® Bria nella prima metà della stagione.

Posizionamento tecnico



Elevata efficacia e persistenza d'azione

Foglia: media di 6 prove condotte in Italia su vite da vino negli ultimi 2 anni




Test di posizionamento con 2 applicazioni consecutive a 10 giorni d'intervallo dei prodotti del grafico nella fase della fioritura.

Le fasi di pre-fioritura sono state trattate per tutte le tesi con 3 applicazioni di Cimoxanil + Mancozeb, quelle di post-fioritura con 3 applicazioni di Dimetomorf + Rame da solfato tribasico e successivamente con Idrossido di rame.

*Rilievo 17-30 giorni dopo il secondo trattamento dei prodotti a confronto.

Grappolo: media di 6 prove condotte in Italia su vite da vino negli ultimi 2 anni



Test di posizionamento con 2 applicazioni consecutive a 10 giorni d'intervallo dei prodotti del grafico nella fase della fioritura.

Le fasi di pre-fioritura sono state trattate per tutte le tesi con 3 applicazioni di Cimoxanil + Mancozeb, quelle di post-fioritura con 3 applicazioni di Dimetomorf + Rame da solfato tribasico e successivamente con Idrossido di rame.

*Rilievo 17-30 giorni dopo il secondo trattamento dei prodotti a confronto.