

# ARIUS™ SYSTEM PLUS

**Fungicida ad azione preventiva ed endoterapica per il controllo in pieno campo dell'oidio su vite, melone, anguria, zucca, melo, pesco, nectarine, fragola e carciofo**

**SOSPENSIONE CONCENTRATA**

**Composizione di ARIUS SYSTEM PLUS**

QUINOXYFEN puro 4 % (= 45 g/l)  
MICLOBUTANIL puro 3,81 % (= 45 g/l)  
Coformulanti q.b. a g 100



**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Sospettato di nuocere al feto. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico. Conservare a temperature non superiori a 40 ° C. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

**Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano**  
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per produzione e/o confezionamento:

**Dow AgroSciences Italia srl** – Mozzanica (Bergamo) (*prod e conf*)

**Dow AgroSciences Ltd** – King's Lynn (Inghilterra) (*prod e conf*)

**Diachem spa** - Caravaggio (BG) (*prod e conf*)

**SIPCAM S.p.A.** - Salerano sul Lambro (LODI) (*prod e conf*)

Sinteco Logistics SpA – S.Giuliano Milanese (MI) (*solo ri-etichettatura*)

Taglie autorizzate: **50 – 100 – 250 – 500 ml**

**1 – 2 – 3 – 5 litri**

Registrazione n. 12837 del 05/02/2013 del Ministero della Salute  
Partita n. vedere sulla confezione

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali: rispettivamente di 30 e 18m per applicazioni precoci e tardive su pomacee e drupacee e di 5 e 9m per applicazioni precoci e tardive su vite; 10m per carciofo, cucurbitacee e fragola. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare guanti adatti durante le operazioni di miscelamento e caricamento; guanti e tuta adatti durante l'applicazione. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Per lo svolgimento delle operazioni agricole successive al trattamento utilizzare guanti e tuta adatti.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

**Sintomi:** in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un centro antiveleni.**

**USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

ARIUS SYSTEM PLUS controlla l'oidio della vite (*Uncinula necator*), del melo (*Podosphaera leucotricha*), del pesco (*Sphaerotheca pannosa*), delle cucurbitacee (*Erysiphe cichoracearum* e *Sphaerotheca fuliginea* sin. *Podosphaera xanthii*), della fragola (*Sphaerotheca macularis*) e del carciofo (*Leveillula taurica*). Controlla anche il marciume nero della vite (*Guignardia bidwellii*).

**Modalità d'applicazione:**

**Vite da vino e vite da tavola:** impiegare ARIUS SYSTEM PLUS alla dose di 1-1,25 L/ha in 150-1000 litri di acqua per ettaro, iniziando i trattamenti quando i germogli sono ben formati. Proseguire ad intervalli di 10-14 giorni fino alla pre-chiusura del grappolo, modulando il turno e il dosaggio in funzione della pressione della malattia. In caso di forte pressione della malattia e su varietà di uva da tavola particolarmente suscettibili, è consigliabile impiegare ARIUS SYSTEM PLUS alla dose di 1,25 L/ha in 150-1000 litri di acqua anche per contenere efficacemente l'oidio del rachide. Non eseguire più di 3 trattamenti per anno e comunque non più di 2 consecutivi.

**Melo:** impiegare ARIUS SYSTEM PLUS alla dose di 1,25 L/ha in 500-1000 litri di acqua e fino a 1,50 L/ha in 1500 litri di acqua, applicando in maniera preventiva, da mazzetti affioranti a frutto ingrossato, ad intervalli di 10-12 giorni. Non eseguire più di 3 trattamenti per anno e comunque non più di 2 consecutivi.

**Pesco, nectarine:** per il controllo dell'oidio impiegare ARIUS SYSTEM PLUS alla dose di 1,25 L/ha in 500-1000 litri di acqua e fino a un massimo di 1,50 L/ha in 1500 litri di acqua, applicando in maniera preventiva dalla sfioritura oppure non oltre la comparsa

dei primissimi sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni. Non eseguire più di 3 trattamenti per anno e comunque non più di 2 consecutivi.

**Melone, anguria e zucca (in pieno campo):** impiegare ARIUS SYSTEM PLUS alla dose di 1-1,25 L/ha in 500-1000 litri di acqua, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la comparsa dei primissimi sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 10-12 giorni. Non applicare su colture che non abbiano ancora superato la crisi di post-trapianto o che risultino indebolite da squilibri idrici, termici o nutrizionali. Non eseguire più di 3 trattamenti per anno e comunque non più di 2 consecutivi.

**Fragola (in pieno campo):** impiegare ARIUS SYSTEM PLUS alla dose di 1,25 L/ha in 500-1000 litri di acqua, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la comparsa dei primissimi sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 10-12 giorni. Non eseguire più di 3 trattamenti per anno e comunque non più di 2 consecutivi.

**Carciofo (in pieno campo):** impiegare ARIUS SYSTEM PLUS alla dose di 1,25-1,5 L/ha in 500-1000 litri di acqua, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la comparsa dei primissimi sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 10-12 giorni. Non eseguire più di 3 trattamenti per anno e comunque non più di 2 consecutivi.

**Nota:** Le dosi per ettolitro indicate sono riferite a trattamenti a volume normale (1000 L/ha). Per trattamenti a basso volume applicare la stessa quantità di prodotto per ettaro che s'impiegherebbe con trattamenti a volume normale rispettando le dosi minime e massime indicate. In ogni caso il prodotto va diluito in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare completamente la vegetazione ma evitando lo sgocciolamento.

Su tutte le colture riportate in etichetta non eseguire più di 3 trattamenti nell'arco della stagione eccetto per pesco, nectarina, dove il massimo numero di trattamenti ammessi per stagione è limitato a 2, e comunque non più di 2 consecutivi.

**PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE FITOSANITARIA**

Immettere nel serbatoio dell'irroratrice metà dell'acqua che s'intende distribuire, aggiungere la dose prevista di ARIUS SYSTEM PLUS, attivare l'agitazione e in seguito portare al volume d'acqua desiderato. La miscela va mantenuta in costante agitazione per tutta la durata del trattamento e anche durante eventuali fermate. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

**LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE**

Dopo l'applicazione e comunque prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia del prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. A questo scopo si raccomanda di sciacquare accuratamente il serbatoio, barra, tubazioni e ugelli, manualmente o impiegando apposite attrezzature a pressione, effettuando almeno tre risciacqui. Distribuire l'acqua di lavaggio sulla coltura appena trattata o smaltirla in conformità alle norme vigenti. Nel caso di utilizzo di detergenti specifici per il lavaggio delle irroratrici e attrezzature agricole attenersi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate sull'etichetta del prodotto.

**Per evitare l'insorgenza di resistenza rispettare le indicazioni relative al numero massimo di trattamenti riportate nei singoli paragrafi delle colture. Si consiglia comunque l'impiego di ARIUS SYSTEM PLUS in alternanza con altri prodotti caratterizzati da un diverso meccanismo di azione.**

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Intervallo di sicurezza:** sospendere le applicazioni **28 giorni** prima della raccolta per vite da tavola e da vino, **14 giorni** per melo, pesco, nectarine, **7 giorni** per anguria, melone, zucca, **3 giorni** per fragola e carciofo.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA**

**(MI): 0039 02 66101029 (24H)**

Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)

Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27/03/2018

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

# ARIUS™ SYSTEM PLUS

FUNGICIDA

SOSPENSIONE CONCENTRATA

**Composizione di ARIUS SYSTEM PLUS**

QUINOXYFEN puro 4 % (= 45 g/l)

MICLOBUTANIL puro 3,81 % (= 45 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100



**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Sospettato di nuocere al feto. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico. Conservare a temperature non superiori a 40 ° C. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

**Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano**

Tel. +39 051 28661

Taglie autorizzate: **50 – 100 ml**

Registrazione n. 12837 del 05/02/2013 del Ministero della Salute

Partita n.: vedere sulla confezione

**PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL  
FOGLIO ILLUSTRATIVO.**

**Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.**

**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**

**Il contenitore non può essere riutilizzato.**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27/03/2018