

# ZORVEC ENICADE®

Antiperonosporico per impieghi su patata,  
pomodoro, melanzana e lattughe.  
Dispersione oleosa

**Meccanismo d'azione: Gruppo 49 (FRAC)**

## ZORVEC ENICADE COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:  
Oxathiapiprolin g 10,1 (= 100 g/L)  
Coformulanti q.b. a 100

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Indossare guanti protettivi (P280). **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352). In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico (P333+P313). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente (P363). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente (P501).

## Titolare della Registrazione

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. Via Pontaccio 10, Milano  
telefono 800378337

## Officine di Produzione e Confezionamento


Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia  
Phyteurop – Z.I. Grande Champagne Montreuil Bellay, France  
-DuPont Crop Protection, 2509 Rocky Ford Road, Valdosta,  
Georgia (USA), 31601

## Officina di sola ri-etichettatura:

Sinteco Logistics – S.Giuliano Milanese (MI)  
Registrazione n° 16895 del 16.01.2018 del Ministero della Salute

**Contenuto netto: Litri 0.12-0.15-0.3-0.4-0.45-0.6-0.9-1-1.2**

## PARTITA N.:



ATTENZIONE

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico o un centro antiveleeni.

## INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di inalazione portare all'aria aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15-20 minuti e consultare un medico. - In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. **Terapia:** sintomatica

**CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118**

## CARATTERISTICHE

ZORVEC ENICADE e' un fungicida ad azione preventiva per il controllo della peronospora della patata e di alcune colture orticole: pomodoro, melanzana e lattughe.

Il prodotto e' dotato di movimento translaminare nelle foglie trattate e di sistemica xilematica.

**ZORVEC ENICADE deve sempre essere applicato in miscela con antiperonosporici aventi diverso meccanismo d'azione.**

## DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO

**PATATA:** per il controllo di peronospora (*Phytophthora infestans*) in pieno campo applicare **0.15 l/ha** di ZORVEC ENICADE avendo cura di bagnare bene la vegetazione.

**Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno, di cui non più di 3 consecutive**, ad un intervallo di 7-10 giorni.

Rispettare l'intervallo piu' breve in caso di alta pressione della malattia.

**POMODORO e MELANZANA:** per il controllo di peronospora (*Phytophthora infestans*) in pieno campo e in serra applicare **0.2 l/ha** di ZORVEC ENICADE avendo cura di bagnare bene la vegetazione. Per volumi d'acqua superiori a 1000 l/ha utilizzare la dose di 20 ml/hl fino ad un massimo di **0.3 l/ha**.

ZORVEC ENICADE, impiegato in miscela con altri antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione, puo' essere usato al dosaggio di **0.12 l/ha**. Per volumi d'acqua superiori a 1000 l/ha utilizzare 12 ml/hl fino ad un massimo di **0.18 l/ha**.

**Effettuare un massimo di 3 applicazioni per anno** rispettando un intervallo di 7-10 giorni. Rispettare l'intervallo piu' breve in caso di alta pressione della malattia.

**LATTUGHE:** per il controllo di peronospora (*Bremia lactucae*) in pieno campo applicare **0.15 l/ha** di ZORVEC ENICADE avendo cura di bagnare bene la vegetazione.

**Effettuare un massimo di 2 applicazioni per ciclo colturale per un totale massimo di 4 applicazioni per anno** ad un intervallo di 7-10 giorni. Rispettare l'intervallo piu' breve in caso di alta pressione della malattia.

## PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Dopo aver riempito per circa meta' della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità necessaria di ZORVEC ENICADE direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Mantenere l'agitatore in funzione durante tutto il trattamento. Non usare agitatori ad aria. Applicare immediatamente dopo la preparazione della soluzione.

Quando usato in miscela si consiglia di introdurre i prodotti nel serbatoio secondo la sequenza:

- sacchetti idrosolubili
- granuli idrosolubili (SG)
- granuli dispersibili (WG)
- polveri bagnabili (WP)
- sospensione concentrata (SC)
- suspoemulsioni (SE)
- dispersioni oleose (OD)
- emulsioni acquose (EW)
- emulsioni concentrate (EC)
- concentrati solubili in acqua (SL)
- fertilizzanti

Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

## PREVENZIONE DELLE RESISTENZE

ZORVEC ENICADE contiene la sostanza attiva oxathiapiprolin che appartiene al gruppo 49 del FRAC. Allo scopo di prevenire la comparsa di resistenza e' necessario adottare i seguenti accorgimenti:

- applicare il prodotto **preventivamente**
- **miscelare** ZORVEC ENICADE con antiperonosporici aventi diverso meccanismo d'azione
- impiegare il prodotto in un **programma** che preveda l'uso di antiperonosporici aventi diverso meccanismo d'azione
- **non applicare** il prodotto in **vivaio**

## AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

## FITOTOSSICITA'

Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di applicazioni su nuove varietà.

## AVVERTENZE AGRONOMICHE

ZORVEC ENICADE deve essere applicato su vegetazione asciutta.

## INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti **3 giorni** prima della raccolta di patata, pomodoro e melanzana, **7 giorni** prima della raccolta delle lattughe.

**ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 16.01.2018 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012 con validità dal 04.11.2018.

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

- Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

-Indossare guanti protettivi e tuta da lavoro durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto.

-Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.